

Artkännedom

signal- och rödlistade arter



Sebastian Kirppu

Nedan finns en lista på ett flertal arter som alla är indikatorer på höga naturvärden i äldre barrdominerade skogar. I listan beskrivs också var i landet dessa arter är bra mångfaldsindikatorer och vilken typ av substrat och växtplats de har. Efter varje artnamn står (S) för att arten endast är signalart eller rödlistekategorin (NT, VU, EN, CR) för signalarten.

Artnamn	vetenskapligt namn	substrat/växtplats	landsdel
Lavar			
Garnlav (NT)	<i>Alectoria sarmentosa</i>	äldre tallar eller granar	hela landet
Violettgrå tagellav (NT)	<i>Bryoria nadvornikiana</i>	på gamla granars grenar	Svea-, Norrland
Nästlav (S)	<i>Bryoria furcellata</i>	på tallar i äldre tallskog	Götaland
Långskägg (VU)	<i>Usnea longissima</i>	i gammal granskog	Svea-, Norrland
Skuggblåslav (S)	<i>Hypogymnia vittata</i>	gambjörk, gamgran, lodvägg	Svea-, Norrland
Grynig blåslav (S)	<i>Hypogymnia farinacea</i>	gambjörk, gamgran, gamtall	Götaland
Norsk näverlav (VU)	<i>Platismatia norvegica</i>	gambjörk, gamgran, lodvägg	Svea-, Norrland
Kolflarnlav (NT)	<i>Carbonicola anthracophila</i>	gamla kolade brandstubbar	Svea-, Norrland
Mörk kolflarnlav (NT)	<i>Carbonicola myrmecina</i>	gamla kolade brandstubbar	Svea-, Norrland
Lunglav (NT)	<i>Lobaria pulmonaria</i>	asp, sälg, rönn	Svea-, Norrland
Skrovellav (NT)nt	<i>Lobaria scrobiculata</i>	asp, sälg, rönn	Svea-, Norrland
Stuplav (S)	<i>Nephroma bellum</i>	asp, sälg, rönn	hela landet
Luddlav (S)	<i>Nephroma resupinatum</i>	asp, sälg, rönn	Svea-, Norrland
Korallblylav (S)	<i>Parmeliella triptophylla</i>	asp, sälg, rönn	hela landet
Gytterlav (S)	<i>Protopannaria pezozoides</i>	asp, rönn, sälg	Svea, Norrland
Dvärgbägarlav (NT)	<i>Cladonia parasitica</i>	död gammal tallvedl	Svea-, Norrland, i södra Sverige även på ekved.
Varglav (NT)	<i>Letharia vulpina</i>	död tallved, +150 år gammal	Svea-, Norrland
Vedskivlav (NT)	<i>Hertelidea botryosa</i>	död tallved, +100 år gammal	Svea-, Norrland
Liten spiklav (S)	<i>Calicium parvum</i>	på äldre tallar, 130+	hela landet
Blågrå svartspik (NT)	<i>Chaenothecopsis fennica</i>	torrakor äldre än 100 år	Svea-, Norrland
Blanksvart spiklav (NT)	<i>Calicium denigratum</i>	torrakor äldre än 100 år	hela landet
Brunpudrad nållav (NT)	<i>Chaenotheca gracillima</i>	på barklös ved av björk å gran	hela landet
Gammelgranslav (S)	<i>Lecanactis abietinum</i>	i basen på gamla granar	Göta-, Svealand
Kattfotslav (S)	<i>Arthonia leucopellaea</i>	rosa fläckar på gamla granar	Göta-, Svealand
Tickor och vedlevande svampar			
Tallticka (NT)	<i>Phellinus pini</i>	tallar äldre än 150 år	hela landet
Fläckporing (VU)	<i>Antrodia albobrunnea</i>	mosslågor av tall +100 år	Svea-, Norrland

Gräddporing (VU)	<i>Cinereomyces lenis</i>	mossågor av tall +100 år	Svea-, Norrland
Gullgröppa (S)	<i>Pseudomerulius aureus</i>	tallågor yngre än 100 år	hela landet
Ullticka (NT)	<i>Phellinus ferrugineofuscus</i>	granågor med barken kvar	hela landet
Vedticka (S)	<i>Phellinus viticola</i>	äldre granågor luktar läder	hela landet
Gränsticka (NT)	<i>Phellinus nigrolimitatus</i>	gamla gran eller tallågor	hela landet
Gammelgranskål (NT)	<i>Pseudographis pinicola</i>	på barken på gamla granar	Svea-, Norrland
Rynkskinn (VU)	<i>Phlebia centrifuga</i>	på granågor med bark	hela landet
Rosenticka (NT)	<i>Fomitopsis rosea</i>	gamla granågor	Svea-, Norrland
Citronporing (CR)	<i>Antrodiella citrinella</i>	klibbtickerötade granågor	hela landet
Apelsinticka (NT)	<i>Hapalopilus aurantiacus</i>	tallågor som är 20-40 år gamla	hela landet
Veckticka (NT)	<i>Antrodia pulvinascens</i>	asplågor barklösa	hela landet

Mossor

Vedtrappmossa (NT)	<i>Anastrophyllum hellerianum</i>	barklösa lågor, gran, tall, asp	hela landet
Kantvitmossa (S)	<i>Sphagnum quinquefarium</i>	i äldre barrnaturskog	hela landet
Kruskalkmossa (S)	<i>Tortella tortuosa</i>	lodväggar på basisk berggrund	hela landet
Bollvitmossa (S)	<i>Sphagnum wulfianum</i>	fuktig mark i naturskog	Svea-, Norrland
Vågig sidenmossa (S)	<i>Plagiothecium undulatum</i>	äldre barrnaturskogar	Svea-, Norrland
Västlig hakmossa (S)	<i>Rhytidiadelphus loreus</i>	äldre barrnaturskogar	Svea-, Norrland
Aspfjädermossa (VU)	<i>Neckera pennata</i>	på aspar i naturskogsmiljö	hela landet
Stor revmossa (S)	<i>Bazzania trilobata</i>	äldre barrnaturskogar	Göta-, Svealand

Vedlevande insekter

Jättesvampmal (S)	<i>Scardia boletella</i>	på gamla döda fnösktickor	hela landet
Raggbock (VU)	<i>Tragosoma depsarium</i>	på solexponerade tallågor	hela landet
Mindre mörghorre (S)	<i>Tomicus minor</i>	nyligen döda tallar(måsvingar)	hela landet
Bronshjon (S)	<i>Callidium coriaceum</i>	torrgranar, cm breda gnagspår	hela landet
Reliktbock (NT)	<i>Nothorhina muricata</i>	solexponerade pansarbarkstallar	hela landet
Kärlväxter			
Knärot (VU)	<i>Goodyera repens</i>	i gammal mossig barrskog	hela landet
Blåsippa (S)	<i>Hepatica nobilis</i>	på kalkhaltig mark	hela landet
Tibast (S)	<i>Daphne mezereum</i>	bördig mark, kalkhaltigt	hela landet
Svartbräken (S)	<i>Asplenium trichomanes</i>	basiska lodväggar	Göta-, Svealand

Röd trolldruva (NT)	<i>Actea erythrocarpa</i>	bördig mark, kalkhaltig	Norra Norrland
Svart trolldruva (S)	<i>Actea spicata</i>	bördig mark, rik berggrund	hela landet
Skogsfru (NT)	<i>Epipogium aphyllum</i>	bördig mark	hela landet
Norna (VU)	<i>Calypso bulbosa</i>	bördig mark, rörligt markvatten	Norrland

Bilder



Tallticka och garnlav. Talltickan lever nästan bara på tallar som passerat 150 års ålder. Garnlaven är gulgrön och delar sig till skillnad mot skägglavarna y-förgrenat. Skägglavar har en massa små utskott/grenar på huvudgrenarna och när man drar i en skägglav (utom långskägg) så visar sig en märm innanför barken på grenen man drar i. Det gör det inte på garnlav.



Violettgrå tagellav är buskig och tvåfärgad, mörkt violett i basen och ljus grå i topparna.



Nästlav har små buskar av små stift på de tjockare huvudgrenarna vilket syns bäst i lupp.



Långskägg är den gamla gran-naturskogens paradart.



Skuggblåslav med långa hängande fingrar och små stift som växer på huvudgrenarna.



Grynig blåslav



Norsk näverlav med sina arttypiska vassa åsar som bildar ett rutnät.



Mörk kolflarnlav (till vänster), blank grönbrun, och kolflarnlav (till höger), grågrön med ljus kant och bruna apothecier (fruktkroppar). På bilden nedan är kolflarnlaven omgärdad av mörk kolflarnlav.





Lunglav (grön) och skrovellav (stålblå/grå). Här växer de båda arterna tillsammans på en gammal sälg.



Korallblylav växer på rikbarksträd som asp, rönn och sälg i lövrika barrnatskogar.



Gytterlav är orangfärgade fläckar på en grå färg som hittas på stambaser av asp, rönn och sälg men ibland på björk.



Luddlav med sina karakteristiska vita prickar på undersidan och ludna blad växer på rikbarksträden i barnnaturskogar.



Dvärgbägarlav med sina små bruna "köttbullar" är lätt att känna igen på gammal tallved som varit död i mer än 100 år.



Varglavens gula färg är omisskännlig och hittas nästintill bara på torrtallar som stått döda i mer än 100 år.



Vedskivlav har en grågrön bål med svarta små skivor som växer i grupper. Skivorna kan se svullna ut när det är blött.



Liten spiklav växer nästan bara på äldre tallar i fina tallnaturskogar. Träden ska vara mer än 120 år gamla.



Blanksvart spiklav (ovan) växer nästan enbart på gamla torrfurur av både klen och grov dimension och då gärna i ljusöppna lägen. Likadant gör blågrå svartspik (nedan) men dessa hittas mestadels på den solexponerade delen av veden.





Brunopudrad nållav, långa knappnålar på björk- eller granved (högstubbar) med ett ljusbrunt huvud och övre stamdelen är ljusbrun.



Kattfotslav (rosa fläck med grå prickar) och gammelgranslav (grå bål med vita prickar)



Fläckporingen är fast i köttet och växer allt som oftast på tallar som legat döda i hundra år, så kallade mosslågor.



Gräddporing växer som en liten mjuk kudde på mossiga gamla tallågor som legat döda i hundra år eller mer. Den får ofta en grönaktig beläggning på fruktkroppen.



Gullgröppa växer på tallågor som legat döda i några decennier.



Ulltickan (ovan) är en resupinat ticka och växer nästan alltid på granlågor som fortfarande har barken kvar. Vedticka (nedan) bildar små hattar på både tall- och granlågor som legat i många år.





Gränsticka på granlåga där den ofta bildar hattar medan den på tallågor växer som en resupinat valk på undersidan.



Gammelgranskål gömmer sig gärna i barkspringorna på granar äldre än 150 år.